



### ■ 貼片使用時之注意事項：

#### (1) 適合黏貼部位：

上身軀幹(如前胸、後背)、上臂、大腿毛髮較少的部位。需避開傷口、發紅或放射線治療部位。

#### (2) 貼黏部位- 須完全乾燥。

- 毛髮過長者：儘可能以剪刀剪短，勿使用剃刀刮除毛髮。
- 以清水清洗貼黏部位，勿使用肥皂或其他清潔用品。

#### (3) 更換貼片時，黏貼位置須更換。

#### (4) 貼片不可剪開使用。

### ■ 貼片使用方法：

#### (1) 撕開fentanyl 貼片包裝及貼片黏貼層。

(2) 將貼片貼於適當部位，以手掌緊壓30秒，使貼片完全平貼於皮膚上，尤其是貼片邊緣位置。

(3) 以清水洗手，勿使用肥皂或其他清潔用品。

### ■ 新舊片替換方法：

(1) 舊片使用滿72小時，於其他適合部位貼上新片，舊片則於使用滿96小時後撕下。

(2) 若現有使用劑量無法有效控制疼痛，在增加劑量前，建議舊片使用滿78小時，即貼上新片。

(3) 使用過的fentanyl 貼片，膠面相對折黏後，放回原包裝袋，連同使用記錄單一同繳回藥局。

### ■ 其他注意事項：

(1) 如果發燒，fentanyl的吸收效果約增加原來的1/3，須特別注意fentanyl 毒性的發生。

(2) 可以正常沐浴，但避免泡熱水澡。

(3) 避免將貼片直接接觸熱源，如熱水袋、電毯。

**若有任何問題可來電諮詢：麻豆新樓醫院 (06)5702228轉7223居家護理所**