


糞便檢查衛教單 (Form-0022)

一般常規糞便檢查 / 糞便潛血反應檢驗

- 1、以檢體瓶蓋的棒杓挖取糞便，約半個成人大拇指大小（相當於 ）。請勿將糞便檢體塞滿收集瓶內。
- 2、如果為水樣糞便，請取 3 cc 糞便檢體倒入收集瓶內。
- 3、注意事項：
 - 3.1 收集的前兩天不可飲食含血肉類（如豬肝、豬血、鴨血、米血）、蘿蔔、阿斯匹靈、維他命 C、鐵劑或含鐵劑之藥物。
 - 3.2 不可直接解入水中再挖取。建議鋪設報紙在地上，再解便在報紙上，以利取得檢體。
 - 3.3 不可用衛生紙包覆糞便再置入收集瓶內。
 - 3.4 如果為腹瀉水樣糞便，請取乾淨之廣口容器留檢體，再倒入收集瓶內。或者請事先告知本科人員以索取吸管，利用吸管吸取 3 cc 檢體置入收集瓶內。
 - 3.5 報告時間約需 3 個工作天。

糞便潛血“免疫法”檢驗

- 1、旋轉瓶蓋並向上拔開採便棒。
- 2、利用採便棒前的螺旋紋在整條糞便上以“井”字型輕畫方式括取檢體，刮取量約為將挖取溝槽完全覆蓋即可。（若糞便檢體檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果）
- 3、插入後，將蓋子用力壓緊（有“喀”一聲才有蓋緊），插入後請不要再拔開。
- 4、放入採便管專用塑膠袋，立刻交回檢驗科收檢窗口/人員。
- 5、注意事項：
 - 5.1 以日常飲食方式進行採檢，即不用禁食。
 - 5.2 不可將管瓶中的液體倒出；或任意於瓶中加水。
 - 5.3 交回檢驗科前應存放於避光陰涼的場所，以冰箱冷藏為佳。
 - 5.4 糞便過硬時，可以加水弄溼，待其軟化再以採便棒刮取。若遇水便時，請改日再取。
 - 5.5 遇痔瘡出血或女性月經期間，請暫停採便檢驗。
 - 5.6 不可直接解入水中再挖取。建議鋪設報紙在地上，再解便在報紙上，以利取得檢體。
 - 5.7 報告時間約需 7 個工作天。

如有採檢上的疑問，歡迎來電洽詢 TEL：(06) 274-8316 轉 1070、1071。

查詢報告請直接掛號由主治醫師解釋報告結果。謝謝！